IPL 光治療　同意書

治療目的

加齢に伴いシミやくすみ、小ジワ、毛細血管の拡張などの症状が現れます
IPL 光治療は、これらの加齢に伴う症状を医療用の特殊な光を照射して改善する治療です
当院では、お肌の状態や症状に合わせて、最も効果的な治療となるよう医師の判断のもと機器の設定を行います

方法

・洗顔後、顔全体または希望の部位に光を照射します。多少のまぶしさと軽い痛みを感じます。
・治療間隔は 3〜4 週間で、繰り返し(5〜6 回程度)治療を行うと、お悩みの症状が徐々に改善していきます。
・1 クール(5〜6 回)治療後も、継続して治療を行うと更に改善がみられます。

主な効果

・シミ、そばかす、炎症後色素沈着などの色素沈着の改善
・キメの乱れ、小ジワ(深いシワには効果がありません)、肌の質感、ハリの改善
・毛細血管拡張症、赤ら顔(温度差によるほてりには効果が乏しい場合があります)、ニキビ、赤いニキビ跡の改善

治療前の注意点

・光治療後はシミの部分が濃く目立つ反応をすることがあるため、1 週間以内に大切な予定がある場合は治療を延期してください
・1 ヵ月以内に海水浴・スキー・ゴルフ・旅行などで強い日焼けをした方は治療前にお知らせください
・光恐怖症、光過敏症、光アレルギー、てんかんなどがある方が事前にお知らせください
・内服中の薬・外用薬のある方は事前にお知らせください

治療後の注意点

・日常生活上は特に制限は無く、洗顔やメイクはすぐに出来ます
・治療直後数時間、治療部位に軽い赤みやヒリヒリ感が残ることがあります
・シミの濃い部分は治療直後に少し濃く変化し、薄いかさぶたができることがあります(5〜7 日程度で自然に剥がれますので、無理に剥がさないでください)※黒く変化する反応は確認できないこともあります
・薄いかさぶたや赤みが落ち着いてくるまでは、エステやフェイスマッサージは避けてください
・ホームピーリングをしている方は、治療期間中は中止してください
・シミの再発を防ぎ、次回の安全な照射を行うために、日焼け止めなどで紫外線防止をしてください

そのほか

・症状によっては、他のレーザー治療、外用治療などの併用をお勧めします
・稀に治療部位に腫れ・水ぶくれ・産毛の濃い部分に毛包炎ができる場合があります
※すべての反応には個人差がありますので、上記以外の症状が生じた場合はご相談ください
ご不明な点、ご質問等がありましたら治療前に必ずお申し出ください
BBL 光治療の説明を十分にご確認のうえ、ご署名をお願いします

説明内容を理解しましたので、治療を受けることに同意します

年　　月　　日

患者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

医療法人　広島ステーションクリニック 美容皮膚科
担当医師　石田 清隆

HSC Hiroshima station clinic
美容皮膚科
TEL:082-568-1080/FAX:082-568-1006