

ダーマスプリングアイ治療 同意書

目の下のしわ・たるみに対して吸収される糸を使用した治療です。皮膚に吸収糸を挿入すると、人体は糸を「異物」と見なし、からだを守ろうと真皮層にある線維芽細胞が活性化し、糸の周りにコラーゲンやエラスチンを増殖させます。吸収糸が体内に吸収される間、コラーゲンは増殖しつづけ、次第に糸だけが溶けてなくなります。糸が体内に吸収された後も、肌内部のコラーゲンが増えた状態にあるので、糸が溶けた後もリフティング効果により肌の内側からハリと弾力を高めます

【治療内容】

- ・ 施術前に麻酔クリームを 20 分間塗布した後、施術直前に局所麻酔を行います
- ・ 施術時間は約 20 分程度です
- ・ 切開せず糸を挿入するだけのため傷跡は目立ちません。直後は針穴程度の傷跡と赤みがありますがすぐに消失します。体質により稀に内出血が出る場合がありますが、メイクで隠せる程度であり数日で改善します。大きな腫れはありませんが、むくみ程度の腫れが 3～7 日出る場合があります

【治療後】

- ・ 治療後は引きあがり感や頬の引きつれなどが出る場合があります。数日間は軽いむくみも出ることもあります。糸の刺入部がチクチク触れて先端に痛みが出る場合があります。人によっては皮膚の上から触ったときに繊維の感触が分かる場合があります
施術後落ち着くまでに 1 か月程度は違和感等の症状が出る場合があります
- ・ 施術当日から 2 日間はお薬(抗生剤/痛み止め)を飲んでいただきます
- ・ 施術当日からメイク・洗顔・入浴はいつも通り可能です
※施術部位は強く擦らないで下さい、サウナ・温泉はしばらくの間は控えて下さい
- ・ 軽い運動は翌日以降でご自身が可能な範囲で、激しい運動は 1 週間後から行って下さい
- ・ お顔のマッサージは、施術後 1 か月程度はお控えください

【通院】

- ・ 治療後の経過観察のため 1 週間後と 1 か月後に通院をしていただくことが望ましいです

私は以上の内容に対して説明を受け、理解しましたので
ダーマアイ治療を受けることに同意します

リドカイン製剤使用に関して

アレルギーなし ・ アレルギーあり

年 月 日

氏名

医療法人 広島ステーションクリニック 美容皮膚科

担当医：石田 清隆

 **Hiroshima station clinic**

美容皮膚科

TEL:082-568-1080/FAX:082-568-1006